



Representación de un actor.

Cómo comenzar con MYQORZO™

PARA ADULTOS CON CARDIOMIOPATÍA HIPERTRÓFICA OBSTRUCTIVA SINTOMÁTICA (CMHO) CON EL FIN DE MEJORAR LA CAPACIDAD FUNCIONAL Y LOS SÍNTOMAS

Se desconoce si MYQORZO es seguro y eficaz en niños.

Usted está a punto de dar los primeros pasos para iniciar un tratamiento con MYQORZO. Se podría estar preguntando cuál es el siguiente paso. Este folleto está diseñado para ayudarlo a usted y a sus seres queridos a saber qué esperar mientras comienza a tomar y toma MYQORZO.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre MYQORZO?

MYQORZO puede causar efectos secundarios graves, como:

- **Insuficiencia cardíaca:** una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza; es una afección grave que puede provocar la muerte. Debe someterse a ecocardiogramas antes del tratamiento con MYQORZO y durante este, y monitorear signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Las personas que desarrollan una enfermedad grave, como una infección grave, o que desarrollan un latido cardíaco irregular nuevo o que empeora, tienen un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca durante el tratamiento con MYQORZO

Informe a su proveedor de atención médica o busque ayuda médica de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas nuevos o si estos empeoran: falta de aliento, dolor torácico, fatiga, hinchazón de piernas, sensación de aceleración del corazón (palpitaciones) o aumento rápido de peso.

Consulte la **Información de Prescripción** completa, incluido el Recuadro de ADVERTENCIA y la **Guía del Medicamento**.

 **MYQORZO™**
(aficamten) 5-10-15-20 mg
tablets



Representación de un actor. MYQORZO no está aprobado para su uso en personas menores de 18 años.

PREPÁRESE

Antes de obtener su receta médica



Una vez que usted y su proveedor de atención médica hayan determinado juntos que MYQORZO™ puede ser adecuado para usted, aquí hay algunas cosas que puede esperar.

Quizás ya haya dado algunos de estos pasos con su proveedor de atención médica en su última visita, y es posible que aún deba dar otros.

- ✓ **Su proveedor de atención médica hablará con usted sobre su estado médico, incluido si:**
 - o Está embarazada o planea quedar embarazada, ya que se desconoce si MYQORZO puede causar daños al bebé en gestación
 - o Está amamantando o planea amamantar, ya que se desconoce si MYQORZO pasa a su leche materna
 - o Está tomando algún medicamento, incluidos medicamentos con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas

- ✓ **Su proveedor de atención médica analizará el Programa de Estrategia de Evaluación y Mitigación de Riesgos (Risk Evaluation and Mitigation Strategy, REMS) de MYQORZO.** Con el fin de ayudar a proteger la salud de las personas que toman medicamentos que tienen determinados riesgos graves, la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de los EE. UU. a veces exige un programa REMS. En algunas personas, MYQORZO puede aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca. El programa REMS de MYQORZO está diseñado para ayudar a reforzar el uso seguro proporcionando instrucciones especiales, monitoreo y educación para el proveedor y el paciente.

Para que pueda comenzar y seguir tomando MYQORZO, su proveedor de atención médica:

- o **Le hará ecocardiogramas para asegurarse de que puede tomar MYQORZO.**
Es importante que se realice los ecocardiogramas en los momentos en que se lo recomiende su médico
- o **Lo ayudará a completar el Formulario de inscripción del paciente** (necesario para empezar a tomar MYQORZO). Su proveedor también analizará los riesgos y beneficios del tratamiento con MYQORZO
- ✓ **Su equipo de atención médica** puede acompañarlo a lo largo de todo el proceso de tratamiento, o usted puede consultar la descripción general en las páginas 10 y 11.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre MYQORZO?
MYQORZO puede causar efectos secundarios graves, como:

- **El riesgo de insuficiencia cardíaca también aumenta cuando se toma MYQORZO con otros medicamentos determinados.**
Informe a su proveedor de atención médica sobre cualquier medicamento de venta con receta y de venta libre que tome, antes del tratamiento con MYQORZO y durante este

Consulte la **Información de Prescripción** completa, incluido el Recuadro de ADVERTENCIA y la **Guía del Medicamento**.





Asistencia en asequibilidad

MYQORZO & You ofrece programas de cobertura y asequibilidad diseñados para brindarle apoyo a lo largo de toda su experiencia de tratamiento.

Programa de ahorro en copagos MYQORZO & You

Si tiene seguro comercial y cumple los requisitos de elegibilidad,* puede pagar tan solo \$5 por MYQORZO y \$0 por los ecocardiogramas. Puede inscribirse visitando myqorzo.com/copaysignup.

Farmacia especializada

MYQORZO está disponible a través de farmacias especializadas que enviarán el medicamento directamente a su hogar. La farmacia especializada lo llamará para programar el envío de su receta; es posible que el número que aparezca en su teléfono no le resulte familiar. Asegúrese de responder la llamada para poder obtener su receta.

Para inscribirse en el Programa de ahorro en copagos MYQORZO & You, visite myqorzo.com/copaysignup. Los pacientes elegibles pueden pagar **tan solo \$5 por MYQORZO y \$0 por los ecocardiogramas.***

*Consulte los términos y condiciones del programa en myqorzo.com.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre MYQORZO?

MYQORZO puede causar efectos secundarios graves, como:

- Debido al riesgo de insuficiencia cardíaca, MYQORZO solo está disponible a través de un programa de distribución restringida denominado Programa de Estrategia de Evaluación y Mitigación de Riesgos (Risk Evaluation and Mitigation Strategy, REMS) de MYQORZO
 - Su proveedor de atención médica debe estar inscrito en el Programa REMS de MYQORZO para poder recetarle MYQORZO
 - Antes de iniciar el tratamiento con MYQORZO, debe inscribirse en el Programa REMS de MYQORZO. Hable con su proveedor de atención médica sobre cómo inscribirse en el programa. Se le dará información sobre el programa cuando se inscriba.
 - Antes de tomar MYQORZO, su proveedor de atención médica y farmacéutico se asegurarán de que entienda cómo tomar MYQORZO de forma segura, lo que incluirá regresar para realizarse ecocardiogramas cuando se lo indique su proveedor de atención médica. MYQORZO solo puede ser dispensado por una farmacia certificada que participe en el Programa REMS de MYQORZO
 - Si tiene alguna pregunta sobre el Programa REMS de MYQORZO, consulte a su proveedor de atención médica, visite www.MYQORZOREMS.com o llame al 1-844-285-7367



Conozca a su Asesor de MYQORZO

Cuando se inscriba en el Programa de apoyo al paciente MYQORZO & You, se conectará con un Asesor exclusivo de MYQORZO. Le brindará ayuda para comenzar y seguir con el tratamiento con MYQORZO.



Una vez inscrito en MYQORZO & You, su Asesor exclusivo de MYQORZO:



Si no se ha inscrito en MYQORZO & You y aún quiere solicitar el apoyo de un Asesor de MYQORZO, visite MYQORZONavigator.com.



Para obtener asistencia general y ayuda con el acceso y la asequibilidad, póngase en contacto con un Asesor de MYQORZO en el 833-MYQORZO (833-697-6796) de lunes a viernes, de 8:00 A. M. a 8:00 P. M., hora del Este.

Si tiene preguntas médicas, llame a su proveedor de atención médica.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

¿Quién no debe tomar MYQORZO?

No tome MYQORZO si toma un medicamento llamado rifampicina.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de MYQORZO?

MYQORZO puede causar efectos secundarios graves, como insuficiencia cardíaca.

Consulte la [Información de Prescripción](#) completa, incluido el Recuadro de ADVERTENCIA y la [Guía del Medicamento](#).



COMIENZE

Cómo tomar MYQORZO™

MYQORZO es un inhibidor de la miosina cardíaca (IMC) cuidadosamente diseñado para usted

Alcance su dosis individualizada

Su proveedor de atención médica puede comenzar a ajustar su dosis apenas 2 semanas después de comenzar con MYQORZO para alcanzar su dosis de mantenimiento individualizada en el término de 8 semanas.*

Usted tiene algo de flexibilidad para programar sus ecocardiogramas (ECO). Trabaje con su proveedor de atención médica para programar un ecocardiograma entre 2 y 8 semanas después de comenzar MYQORZO y después de cualquier cambio en la dosis.



*En función de los ecocardiogramas realizados 2 a 8 semanas después de iniciar el tratamiento y luego de cualquier cambio en la dosis.

†MYQORZO se puede aumentar en incrementos de 5 mg hasta 20 mg. Si en algún momento tiene una disminución en la fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI), tiene una enfermedad grave o comienza a tomar determinados medicamentos, es posible que su proveedor de atención médica deba reducir la dosis de MYQORZO o incluso suspenderlo temporalmente.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de tomar MYQORZO?

Antes de tomar MYQORZO, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluyendo si usted:

- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si MYQORZO puede causar daños al feto. Informe a su proveedor de atención médica si queda embarazada durante el tratamiento o en las 3 semanas posteriores a la última dosis de MYQORZO. Existe un estudio sobre MYQORZO durante el embarazo. Su proveedor de atención médica debe notificar a Cytokinetics, Inc. sobre su exposición al medicamento durante el embarazo.
- Está amamantando o planea hacerlo. Se desconoce si MYQORZO pasa a su leche materna. Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor forma de alimentar a su bebé durante el tratamiento con MYQORZO

Una vez que su proveedor de atención médica determine su dosis individualizada, es importante que tome MYQORZO diariamente, según las indicaciones

- Tome MYQORZO exactamente como le indique su proveedor de atención médica
- No cambie su dosis de MYQORZO sin hablar primero con su proveedor de atención médica
- Tome MYQORZO 1 vez al día, aproximadamente a la misma hora cada día
- Tome MYQORZO con o sin alimentos
- Trague el comprimido de MYQORZO entero
- Si olvida una dosis de MYQORZO, tómela tan pronto como sea posible y tome la siguiente dosis a la hora habitual al día siguiente. No tome 2 dosis el mismo día para compensar una dosis omitida
- Su proveedor de atención médica puede cambiarle la dosis o interrumpir temporalmente su tratamiento con MYQORZO si tiene ciertos efectos secundarios
- Si toma demasiado MYQORZO, llame a su proveedor de atención médica o a la Línea de Ayuda de Control de Toxicología al 1-800-222-1222 o acuda de inmediato a la sala de urgencias del hospital más cercano

MYQORZO es un comprimido que se toma una vez al día y está disponible en 4 concentraciones de dosis:



No es el tamaño real de los comprimidos.

Tamaño frente a moneda de 10 centavos de EE. UU.:

5 mg

10 mg

15 mg

20 mg

Moneda de 10 centavos de EE. UU. para apreciar la escala

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de tomar MYQORZO?

Antes del tratamiento con MYQORZO y durante este, informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas que toma. Tomar MYQORZO con determinados medicamentos puede provocar un aumento de los niveles de MYQORZO en su sangre y aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca. **No interrumpa ni cambie la dosis de un medicamento ni empiece a tomar un medicamento nuevo sin informar a su proveedor de atención médica.**

Informe especialmente a su proveedor de atención médica si toma fluconazol (si se usa durante más de 3 días), voriconazol o fluvoxamina.

Consulte la **Información de Prescripción** completa, incluido el Recuadro de ADVERTENCIA y la **Guía del Medicamento**.

MYQORZO™
(aficanten)
5-10-15-20 mg tablets



MYQORZO puede provocar efectos secundarios graves, como insuficiencia cardíaca, por lo que su médico monitoreará el funcionamiento de su corazón.

Informe a su proveedor de atención médica o busque ayuda médica de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas nuevos, o si estos empeoran:

- Falta de aliento
- Dolor torácico
- Hinchazón en las piernas
- Sensación de aceleración del corazón (palpitaciones)
- Fatiga
- Aumento rápido de peso



El efecto secundario más frecuente de MYQORZO es la presión arterial alta (hipertensión).

En el ensayo clínico, ningún participante tuvo interrupciones del tratamiento ni empeoramiento de los eventos de insuficiencia cardíaca debido a una disminución de la fracción de eyección. La fracción de eyección compara la cantidad de sangre que hay en la cavidad cardíaca con la cantidad de sangre que se bombea.



No tome MYQORZO si toma un medicamento llamado rifampicina, ya que no es seguro tomar estos medicamentos juntos

Antes y durante el tratamiento con MYQORZO, informe a su proveedor de atención médica sobre lo siguiente:



Todos los medicamentos que toma:

- Incluidos medicamentos con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. Tomar MYQORZO con algunos medicamentos puede aumentar su riesgo de insuficiencia cardíaca
- No interrumpa ni cambie la dosis de un medicamento ni empiece a tomar un medicamento nuevo sin informar a su proveedor de atención médica
- Informe especialmente a su proveedor de atención médica si toma los medicamentos fluconazol (si se usa durante más de 3 días), voriconazol o fluvoxamina, ya que puede ser necesario un cambio en la dosis

Todas las afecciones médicas, incluso si:

- Está embarazada, planea quedar embarazada o queda embarazada en las 3 semanas posteriores a la última dosis de MYQORZO. Se desconoce si MYQORZO puede causar daños al feto
- Está amamantando o planea hacerlo. Se desconoce si MYQORZO pasa a su leche materna

Programa de Estrategia de Evaluación y Mitigación de Riesgos (REMS) de MYQORZO



Con el fin de ayudar a proteger la salud de las personas que toman medicamentos que tienen determinados riesgos graves, la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de los EE. UU. a veces exige un programa REMS. En algunas personas, MYQORZO puede aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca. El Programa REMS de MYQORZO está diseñado para ayudar a reforzar el uso seguro proporcionando instrucciones especiales, monitoreo y educación para el proveedor y el paciente.

Si su proveedor de atención médica determina que MYQORZO es adecuado para usted, lo ayudará a inscribirse en el programa para que pueda comenzar. Obtenga más información en [MYQORZO.com/REMS](https://myqorzo.com/REMS).

¿Qué es un inhibidor de la miosina cardíaca (IMC)?

Los IMC funcionan reduciendo la actividad de la miosina para permitir interacciones más normales entre la miosina y la actina. Esto ayuda a evitar que el corazón se contraiga con mucha fuerza. Los IMC son la única clase de fármaco aprobada por la FDA para adultos con CMHO obstructiva sintomática.

¿Por qué debo hacerme ecocardiogramas?

Un ecocardiograma es un tipo de ecografía del corazón. Puede ayudar a su proveedor de atención médica a ver cómo está funcionando el corazón. Esto ayuda a su proveedor de atención médica a asegurarse de que está tomando la mejor dosis para usted.

Deberá hacerse un ecocardiograma antes de comenzar MYQORZO (si no se ha hecho uno recientemente), cada vez que se aumente la dosis y, luego, cada 6 meses después de alcanzar la dosis individualizada (algunas personas pueden necesitar hacerse uno cada 3 meses, pero su proveedor de atención médica le informará si ese es su caso).

¿Cómo se establece mi dosis individualizada?

Comenzará tomando 5 mg de MYQORZO y se le realizará un ecocardiograma de 2 a 8 semanas después. El ecocardiograma le permite al proveedor de atención médica ver los efectos que MYQORZO tiene en el corazón. La dosis se aumentará en incrementos de 5 mg hasta que obtenga el efecto máximo con efectos secundarios mínimos.

¿Qué sucede si accidentalmente omito una dosis?

Si omite una dosis de MYQORZO, tómela tan pronto como sea posible y tome la siguiente dosis a la hora habitual al día siguiente. No tome 2 dosis el mismo día para compensar una dosis omitida.

¿Qué sucede si tengo efectos secundarios?

Llame a su proveedor de atención médica si tiene algún efecto secundario nuevo o si alguno empeora. También puede notificar los efectos secundarios a Cytokinetics® en el 833-MEDCYTO (1-833-633-2986) o enviando un correo electrónico a medicalinformation@cytokinetics.com.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de MYQORZO?

El efecto secundario más frecuente de MYQORZO es la presión arterial alta (hipertensión).

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de MYQORZO. Hable con su proveedor de atención médica para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede notificar los efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088. También puede notificar sobre los efectos secundarios a Cytokinetics al 1-833-633-2986.

Consulte la **Información de Prescripción completa**, incluido el Recuadro de ADVERTENCIA y la **Guía del Medicamento**.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios del tratamiento con MYQORZO?

MYQORZO puede provocar insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza. La insuficiencia cardíaca es una afección grave que puede provocar la muerte. Las personas que desarrollan una infección grave o que tienen un problema nuevo o agravamiento de un problema del ritmo cardíaco pueden tener mayor riesgo de tener insuficiencia cardíaca durante el tratamiento con MYQORZO.

Informe a su proveedor de inmediato si experimenta alguno de los siguientes síntomas:

- Falta de aliento
- Dolor torácico
- Hinchazón en las piernas
- Sensación de aceleración del corazón (palpitaciones)
- Fatiga
- Aumento rápido de peso

El efecto secundario más frecuente de MYQORZO es la presión arterial alta (hipertensión).

¿Por qué se requiere un REMS?

REMS, que significa Estrategia de Evaluación y Mitigación de Riesgos, es un programa de seguridad del fármaco requerido por la FDA para ciertos medicamentos. REMS garantiza que tenga la información que necesita para tomar su medicamento de forma segura.

¿Hay apoyo disponible una vez que esté tomando MYQORZO?

Sí. El Programa de apoyo al paciente MYQORZO & You ofrece apoyo personalizado al paciente durante su experiencia de tratamiento. Puede inscribirse a través de su proveedor de atención médica u obtener más información llamando al 833-MYQORZO (833-697-6796).

¿Hay asistencia con el costo de MYQORZO?

Una vez inscrito en MYQORZO & You, su Asesor puede ponerlo en contacto con programas de asequibilidad en función de su elegibilidad. Los pacientes con seguro comercial elegibles también pueden pagar tan solo \$5 por MYQORZO a través del Programa de ahorro en copagos MYQORZO & You. Puede inscribirse en myqorzo.com/copaysignup.



Descripción general de MYQORZO™

Cómo empezar y seguir con MYQORZO

PREPÁRESE

Cómo obtener la receta

LISTO

Cómo comenzar con MYQORZO

COMIENCE

A tomar MYQORZO

¿Ha hecho lo siguiente?



Su proveedor de atención médica hablará con usted acerca de:

- Cualquier medicamento que pueda estar tomando
- Cualquier afección médica existente, incluido un embarazo



Su proveedor programará un ecocardiograma para confirmar su elegibilidad para el tratamiento con MYQORZO



Su proveedor analizará con usted el Programa de Estrategia de Evaluación y Mitigación de Riesgos (REMS) y:

- Le entregará la Guía del medicamento de MYQORZO y la Guía para el paciente de REMS
- Lo inscribirá en el programa REMS o lo remitirá a un proveedor de atención médica certificado por REMS que pueda hacer la inscripción. Para obtener más información sobre el programa REMS, visite [MYQORZO.com/REMS](https://myqorzo.com/REMS) o llame al 844-285-7367



Su proveedor de atención médica puede inscribirlo en el Programa de apoyo al paciente MYQORZO & You

- MYQORZO & You ofrece apoyo personalizado al paciente durante su experiencia de tratamiento
- Usted puede llamar a un Asesor de MYQORZO para obtener más información sobre el programa al 833-MYQORZO (833-697-6796)



Una vez que su médico le receta MYQORZO:

- Si su proveedor o equipo de atención médica lo ha inscrito en el Programa de apoyo al paciente MYQORZO & You, recibirá una llamada de bienvenida de un Asesor de MYQORZO en el plazo de 1 día hábil. Un Asesor es su contacto exclusivo que lo ayudará a comenzar y mantenerse en su tratamiento con MYQORZO

Espere una llamada de su Asesor de MYQORZO

- ¿Su proveedor o equipo de atención médica no lo ha inscrito? Puede solicitar la ayuda de un Asesor de MYQORZO en [MYQORZONavigator.com](https://myqorzonavigator.com). También puede inscribirse en el Programa de ahorro en copagos MYQORZO & You en myqorzo.com/copaysignup.



Recibirá una llamada de la farmacia especializada para coordinar el envío de MYQORZO

- Asegúrese de responder la llamada de su farmacia especializada. Puede llegar de un número de teléfono desconocido



Alcance su dosis individualizada

Su proveedor de atención médica puede comenzar a ajustar su dosis apenas 2 semanas después de comenzar con MYQORZO, lo que posiblemente le permita alcanzar su dosis de mantenimiento individualizada en el término de 8 semanas.*

*En función de los ecocardiogramas realizados 2 a 8 semanas después de iniciar el tratamiento y luego de cualquier cambio en la dosis.



Su equipo de atención médica programará un ecocardiograma de mantenimiento cada 6 meses

Según los resultados del ecocardiograma, es posible que deba realizarse un seguimiento cada 3 meses.



Apoyo constante de un Asesor de MYQORZO

Si se inscribió en MYQORZO & You, recibirá llamadas periódicas de su Asesor exclusivo acerca de

- La elegibilidad continua en programas de asequibilidad
- Recordatorios de resurtido
- Apoyo con el estilo de vida

- 

Prepárese

 - ☐ Habló con su proveedor de atención médica sobre su MYQORZO y cualquier medicamento o afección médica
 - ☐ Se hizo un ecocardiograma
 - ☐ Se inscribió en el Programa de apoyo al paciente MYQORZO & You (inscripción opcional)
- 

Listo

 - ☐ Recibió una llamada de su Asesor de MYQORZO y habló sobre programas asistenciales de ahorro para los que puede ser elegible (inscripción opcional)
 - ☐ Recibió una llamada de la farmacia especializada para coordinar el envío de MYQORZO
- 

Comience

 - ☐ Recibió su tratamiento de MYQORZO y comenzó su primera dosis
 - ☐ Su proveedor de atención médica le programó su primer ecocardiograma (y cualquiera necesario después de los cambios de dosis)

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre MYQORZO?

MYQORZO puede causar efectos secundarios graves, como:

- **Insuficiencia cardíaca:** una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza, es una afección grave que puede provocar la muerte. Debe someterse a ecocardiogramas antes del tratamiento con MYQORZO y durante este, y monitorear signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Las personas que desarrollan una enfermedad grave, como una infección grave, o que desarrollan un latido cardíaco irregular nuevo o que empeora, tienen un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca durante el tratamiento con MYQORZO

Informe a su proveedor de atención médica o busque ayuda médica de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas nuevos o si estos empeoran: falta de aliento, dolor torácico, fatiga, hinchazón de piernas, sensación de aceleración del corazón (palpitaciones) o aumento rápido de peso.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre MYQORZO?

MYQORZO puede causar efectos secundarios graves, como:

- **El riesgo de insuficiencia cardíaca también aumenta cuando se toma MYQORZO con otros medicamentos determinados.** Informe a su proveedor de atención médica sobre cualquier medicamento de venta con receta y de venta libre que tome, antes del tratamiento con MYQORZO y durante este

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional que se incluye a lo largo del contenido y la **Información de Prescripción completa**, incluido el Recuadro de ADVERTENCIA y la **Guía del Medicamento**.



**My
Gratitude
JOURNAL**

Estar al aire libre con mi hijo se siente muy bien. Apilamos un montón de hojas para que saltara y le alegró el día.

Espero con ilusión poder pasar más tiempo juntos al aire libre.



Representación de un actor. MYQORZO no está aprobado para su uso en personas menores de 18 años.

Si tiene preguntas o necesita apoyo para empezar a tomar MYQORZO™, aquí estamos para ayudar.

Si tiene preguntas médicas, llame a su proveedor de atención médica. Para obtener apoyo y asistencia con el acceso y la asequibilidad:



Póngase en contacto con un Asesor de MYQORZO en el 833-MYQORZO (833-697-6796)
de lunes a viernes, de 8 A. M. a 8 P. M., hora del Este.

Para obtener más información sobre el Programa de apoyo al paciente MYQORZO & You, visite myqorzo.com/support.

INDICACIÓN Y USO

MYQORZO es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar a adultos con cardiomiopatía hipertrófica obstructiva (CMHO) sintomática con el fin de mejorar la capacidad funcional y los síntomas.

Se desconoce si MYQORZO es seguro y eficaz en niños.

Consulte la [Información de Prescripción](#) completa, incluido el Recuadro de ADVERTENCIA y la [Guía del Medicamento](#).

 **MYQORZO™**
(aficamten) 5-10-15-20 mg
tablets


Cytokinetics

CYTOKINETICS® y el logotipo en forma de C de CYTOKINETICS son marcas comerciales registradas de Cytokinetics en los EE. UU. y algunos otros países. MYQORZO™, el logotipo de MYQORZO y el logotipo de MYQORZO & You son marcas comerciales de Cytokinetics en los EE. UU.
© 2026 CYTOKINETICS. Todos los derechos reservados. US-MYQ-00110 06/2026