

GUÍA DEL MEDICAMENTO MYQORZO® (my-kor-zo) (aficamten) comprimidos, para uso oral

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre MYQORZO?

MYQORZO puede causar efectos secundarios graves, como:

- **Insuficiencia cardíaca:** una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza. La insuficiencia cardíaca es una afección grave que puede provocar la muerte. Debe someterse a ecocardiogramas antes del tratamiento con MYQORZO y durante este, y monitorear los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Las personas que desarrollan una enfermedad grave, como una infección grave, o que desarrollan un latido cardíaco irregular nuevo o que empeora, tienen un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca durante el tratamiento con MYQORZO. Informe a su proveedor de atención médica o busque ayuda médica de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas nuevos, o si estos empeoran:
 - falta de aliento
 - hinchazón en las piernas
 - sensación de aceleración del corazón (palpitaciones)
 - fatiga
 - dolor torácico
 - aumento rápido de peso
- **El riesgo de insuficiencia cardíaca también aumenta cuando se toma MYQORZO con otros medicamentos determinados.** Informe a su proveedor de atención médica sobre los medicamentos que toma, tanto de venta con receta como de venta libre, antes del tratamiento con MYQORZO y durante este.
- **Debido al riesgo de insuficiencia cardíaca, MYQORZO solo está disponible a través de un programa de distribución restringida denominado Programa de Estrategia de Evaluación y Mitigación de Riesgos (Risk Evaluation and Mitigation Strategy, REMS) de MYQORZO.**
 - Su proveedor de atención médica debe estar inscrito en el Programa REMS de MYQORZO para poder recetarle MYQORZO.
 - Antes de iniciar el tratamiento con MYQORZO, debe inscribirse en el Programa REMS de MYQORZO. Hable con su proveedor de atención médica sobre cómo inscribirse en el programa. Se le dará información sobre el programa cuando se inscriba.
 - Antes de tomar MYQORZO, su proveedor de atención médica y farmacéutico se asegurarán de que entienda cómo tomar MYQORZO de forma segura, lo que incluirá regresar para realizarse ecocardiogramas cuando se lo indique su proveedor de atención médica.
MYQORZO solo puede ser dispensado por una farmacia certificada que participe en el Programa REMS de MYQORZO. Su proveedor de atención médica puede proporcionarle información sobre cómo encontrar una farmacia certificada.
 - Si tiene alguna pregunta sobre el Programa REMS de MYQORZO, consulte a su proveedor de atención médica, visite www.MYQORZOREMS.com o llame al 1-844-285-7367.
- Consulte “¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de MYQORZO?” para obtener información sobre los efectos secundarios.

¿Qué es MYQORZO?

MYQORZO es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar a adultos con cardiomiopatía hipertrófica obstructiva (CMHO) sintomática con el fin de mejorar la capacidad funcional y los síntomas.

Se desconoce si MYQORZO es seguro y eficaz en niños.

¿Quién no debe tomar MYQORZO?

No tome MYQORZO si toma un medicamento llamado rifampicina.

Antes de tomar MYQORZO, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si usted cumple con lo siguiente:

- está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si MYQORZO puede causar daños al feto. Informe a su proveedor de atención médica si queda embarazada durante el tratamiento o en las 3 semanas posteriores a la última dosis de MYQORZO. Existe un estudio sobre la seguridad de MYQORZO durante el embarazo. Su proveedor de atención médica debe notificar a Cytokinetics, Inc. sobre su exposición durante el embarazo.
- está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si MYQORZO pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de atención médica sobre la mejor forma de alimentar a su bebé durante el tratamiento con MYQORZO.

Antes del tratamiento con MYQORZO y durante este, informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Tomar MYQORZO con determinados medicamentos puede provocar un aumento de los niveles de MYQORZO en sangre y aumentar su riesgo de insuficiencia cardíaca. **No interrumpa ni cambie la dosis de un medicamento ni empiece a tomar un medicamento nuevo sin informar a su proveedor de atención médica.**

Informe especialmente a su proveedor de atención médica si toma estos medicamentos:

- fluconazol (si se usa durante más de 3 días)
- voriconazol
- fluvoxamina

GUÍA DEL MEDICAMENTO MYQORZO® (my-kor-zo) (aficamten) comprimidos, para uso oral

¿Cómo debo tomar MYQORZO?

- Tome MYQORZO exactamente como le indique su proveedor de atención médica.
- No cambie su dosis de MYQORZO sin hablar primero con su proveedor de atención médica.
- Tome MYQORZO 1 vez al día, aproximadamente a la misma hora cada día.
- Tome MYQORZO con o sin alimentos.
- Trague el comprimido de MYQORZO entero.
- Si olvida una dosis de MYQORZO, tómela tan pronto como sea posible y tome la siguiente dosis a la hora habitual, al día siguiente. No tome 2 dosis el mismo día para compensar una dosis omitida.
- Su proveedor de atención médica puede cambiarle la dosis o interrumpir temporalmente su tratamiento con MYQORZO si tiene ciertos efectos secundarios.
- Si toma demasiado MYQORZO, llame a su proveedor de atención médica o a la Línea de Ayuda de Control de Toxicología al 1-800-222-1222 o acuda de inmediato a la sala de urgencias del hospital más cercano.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de MYQORZO?

MYQORZO puede causar efectos secundarios graves, como:

- **Insuficiencia cardíaca.** Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre MYQORZO?”.

El efecto secundario más frecuente de MYQORZO es la presión arterial alta (hipertensión).

Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede notificar los efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.

También puede notificar sobre los efectos secundarios a Cytokinetics al 1-833-633-2986.

¿Cómo debo almacenar MYQORZO?

- Almacene MYQORZO a temperatura ambiente entre 68 °F y 77 °F (20 °C y 25 °C).
- MYQORZO viene en un frasco con cierre a prueba de niños.

Mantenga MYQORZO y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Información general sobre el uso seguro y eficaz de MYQORZO.

En ocasiones, los medicamentos se recetan para fines distintos a los que se indican en la Guía del Medicamento. No use MYQORZO para una afección para la que no se haya recetado. No dé MYQORZO a otras personas, incluso si tienen los mismos síntomas que usted, ya que podría perjudicarlas. Puede pedir a su farmacéutico o proveedor de atención médica información sobre MYQORZO escrita para profesionales de la salud.

¿Cuáles son los ingredientes de MYQORZO?

Ingrediente activo: aficamten

Ingredientes inactivos: croscarmelosa sódica, hidroxipropilcelulosa, estearato de magnesio (no bovino), manitol, celulosa microcristalina y laurilsulfato de sodio.

El recubrimiento del comprimido contiene: carmín, Azul FD&C n.º 2, mono y dicaprilato de glicerilo, alcohol polivinílico, copolímero de polietileno injertado con alcohol polivinílico, talco y dióxido de titanio.

Consulte la **Información de prescripción** completa, incluido el recuadro de **ADVERTENCIA**.

Distribuido por:

Cytokinetics, Incorporated, South San Francisco, CA 94080

Información sobre patentes:

<https://cytokinetics.com/patents>

Esta Guía del Medicamento ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.
Publicada: 05/2026

**Para obtener más información y recursos,
visite myqorzo.com.**



MYQORZO es una marca comercial registrada y el logotipo de MYQORZO son es una marcas comerciales de Cytokinetics en los EE. UU. Cytokinetics® CYTOKINETICS® y el logotipo en forma de C son marcas comerciales registradas de Cytokinetics en los EE. UU.
© 2026 Cytokinetics, Incorporated. Todos los Derechos Reservados.
US-MYQ-00112 06/2026